

СПИД И ВИЧ

СПИД - СИНДРОМ
ПРИОБРЕТЁННОГО
ИММУНОДЕФИЦИТА.

Синдром – это набор
определённых проявлений
болезни – симптомов.

СПИД развивается у людей, заразившихся **ВИЧ** –
инфекцией, и является конечной стадией этой болезни.

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, он поражает
разные клетки организма человека, в первую очередь –
иммунной системы.

Люди заражённые ВИЧ, называются «ВИЧ –
инфицированными». С момента заражения ВИЧ до
развития СПИДа может пройти от 5 до 15 лет. Пока ВИЧ
– инфекция не перешла в стадию СПИДа,
инфицированный человек может чувствовать себя
хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что
заражён. Только врач при помощи специального анализа
крови может определить, что человек заражён ВИЧ.

Человек, у которого появился этот вирус, теряет
способность к борьбе с любыми инфекциями. Убить
вирус можно нагреванием кровеносной системы до
+56°C в течение 50 минут. Так как эту процедуру не
сможет выдержать ни один человек, можно говорить о
том, что вылечить это заболевание невозможно.

Вирус иммунодефицита человека не передаётся:

Через укусы насекомых и другие контакты с животными
При кашле, чихании

Через рукопожатия и объятия

Через общую посуду

Через предметы гигиены и туалета

В бассейне, ванне, бани

ПРИ СДАЧЕ КРОВИ НА АНАЛИЗ (кровь забирают
с помощью одноразовых инструментов)

